


Министерство здравоохранения Республики Беларусь  
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Министра  
Д.Л.Пиневич  
«04» октября 2013 г.  
Идентификационный № 083-0813



**МЕТОД ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ПАЦИЕНТОВ С НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ**

инструкция по применению

УЧРЕЖДЕНИЕ-РАЗРАБОТЧИК:

Учреждение образования

«Гродненский государственный медицинский университет»

АВТОРЫ:

д.м.н., профессор Лис М.А., к.м.н., доцент Соколов К.Н., Курбат О.П.,  
к.м.н. Корнелюк Д.Г.

Гродно, 2013

В настоящей инструкции по применению «Метод дифференцированного лечения пациентов с нестабильной стенокардией напряжения» изложен алгоритм дифференцированного лечения пациентов с нестабильной (прогрессирующей) стенокардией напряжения с низким риском развития смерти и инфаркта миокарда.

Инструкция предназначена для врачей-кардиологов, иных врачей-специалистов специализированных отделений, кардиологических диспансеров Республики Беларусь, оказывающих медицинскую помощь пациентам с нестабильной стенокардией напряжения.

Применение этого метода позволит повысить эффективность терапии данной категории пациентов.

#### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Ишемическая болезнь сердца: нестабильная (прогрессирующая) стенокардия напряжения с низким риском развития смерти и инфаркта миокарда на третьи сутки госпитализации.

#### ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

1. Назначаемые лекарственные средства:

а) лекарственные средства стандартной терапии (бета-адреноблокаторы, нитроглицерин, нитроглицерин, антикоагулянты, антитромбоцитарные средства, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, статины);

б) кардиальный цитопротектор триметазидина дигидрохлорид 35 мг.

#### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Индивидуальная непереносимость триметазидина дигидрохлорида.

#### ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА

Медикаментозная коррекция

Пациентам назначают стандартную терапию ( $\beta$ -адрено-блокатор, нитроглицерин, антикоагулянт, антитромбоцитарное средство, ингибитор ангиотензинпревращающего фермента, статин) согласно действующим национальным рекомендациям.

При выявлении безболевой ишемии миокарда продолжительностью 23 - 54 минуты в сутки к лечению на третий день добавляют 35 мг триметазидина дигидрохлорида внутрь два раза в сутки.

### ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ

При соблюдении требований к отбору пациентов на этапах обследования применение триметазидина дигидрохлорида осложнений не вызывает.



\_\_\_\_\_  
название  
\_\_\_\_\_  
учреждения  
\_\_\_\_\_  
здравоохранения

УТВЕРЖДАЮ  
Главный врач

\_\_\_\_\_  
ИОФ

\_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_  
МП

**А К Т**

учета практического использования инструкции по применению

**1. Инструкция по применению:** «Метод дифференцированного лечения пациентов с нестабильной стенокардией напряжения».

**2. Утверждена Министерством здравоохранения Республики Беларусь 04.10.2013 № 083 - 0813.**

**3. Кем предложена разработка:** сотрудниками Учреждения образования «Гродненский государственный медицинский университет»: профессором кафедры пропедевтики внутренних болезней М.А.Лисом, доцентом К.Н.Соколовым, ассистентом О.П.Курбат и ассистентом 2-й кафедры внутренних болезней Д.Г.Корнелюком.

**4. Материалы инструкции использованы для** \_\_\_\_\_

**5. Где внедрено** \_\_\_\_\_

наименование учреждения здравоохранения  
**6. Результаты применения метода за период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_**  
**общее кол-во наблюдений « \_\_\_\_\_ »**  
**положительные « \_\_\_\_\_ »**  
**отрицательные « \_\_\_\_\_ »**

**7. Эффективность внедрения (восстановление трудоспособности, снижение заболеваемости, рациональное использование коечного фонда, врачебных кадров и медицинской техники)** \_\_\_\_\_

**8. Замечания, предложения:** \_\_\_\_\_

201 \_\_\_\_\_ **Ответственные за внедрение**

\_\_\_\_\_  
Должность

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
И.О.Фамилия

\_\_\_\_\_  
подпись

Примечание: акт о внедрении направлять по адресу:  
кафедра пропедевтики внутренних болезней  
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
ул. Горького, 80  
230009, г. Гродно



\_\_\_\_\_  
название  
\_\_\_\_\_  
учреждения  
\_\_\_\_\_  
здравоохранения

УТВЕРЖДАЮ  
Главный врач

\_\_\_\_\_  
ИОФ

\_\_\_\_\_201\_\_\_\_\_  
МП

### А К Т

учета практического использования инструкции по применению

**1. Инструкция по применению:** «Метод дифференцированного лечения пациентов с нестабильной стенокардией напряжения».

**2. Утверждена Министерством здравоохранения Республики Беларусь 04.10.2013 № 083 - 0813.**

**3. Кем предложена разработка:** сотрудниками Учреждения образования «Гродненский государственный медицинский университет»: профессором кафедры пропедевтики внутренних болезней М.А.Лисом, доцентом К.Н.Соколовым, ассистентом О.П.Курбат и ассистентом 2-й кафедры внутренних болезней Д.Г.Корнелюком.

**4. Материалы инструкции использованы для** \_\_\_\_\_

**5. Где внедрено** \_\_\_\_\_

наименование учреждения здравоохранения \_\_\_\_\_  
**6. Результаты применения метода за период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_**  
**общее кол-во наблюдений « \_\_\_\_\_ »**  
**положительные « \_\_\_\_\_ »**  
**отрицательные « \_\_\_\_\_ »**

**7. Эффективность внедрения (восстановление трудоспособности, снижение заболеваемости, рациональное использование коечного фонда, врачебных кадров и медицинской техники)** \_\_\_\_\_

**8. Замечания, предложения:** \_\_\_\_\_

201 \_\_\_\_\_  
**Ответственные за внедрение**

\_\_\_\_\_  
Должность

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
И.О.Фамилия

\_\_\_\_\_  
подпись

Примечание: акт о внедрении направлять по адресу:  
кафедра пропедевтики внутренних болезней  
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
ул. Горького, 80  
230009, г. Гродно

