

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Министра

Д.Л.Пиневич



201 5 г.

№ 224 - 1215

**МЕТОД ОЦЕНКИ РИСКА ОСТРОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЧЕК  
У ДЕТЕЙ С ОСТРЫМИ КИШЕЧНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ**

инструкция по применению

(патент № 18116 от 30.04.2014)

**УЧРЕЖДЕНИЕ-РАЗРАБОТЧИК:**

Учреждение образования

«Гродненский государственный медицинский университет»

**АВТОРЫ:**

д.м.н., профессор Цыркунов В. М., Парфенчик И. В.

Гродно, 2015

В настоящей инструкции по применению (далее – инструкция) изложен метод оценки риска развития острого повреждения почек (ОПП) у детей с острыми кишечными инфекциями (ОКИ), который может быть использован в комплексе медицинских услуг, направленных на медицинскую профилактику ОПП у детей с ОКИ. Метод, изложенный в настоящей инструкции, предназначен для врачей-инфекционистов, врачей-педиатров, врачей-нефрологов, иных врачебных специалистов организаций здравоохранения оказывающих медицинскую помощь детям с ОКИ.

#### ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, РЕАКТИВОВ И Т.Д.

Стандартные медицинские изделия, применяемые для определения содержания восстановленного глутатиона (GSH).

#### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Острые кишечные инфекции.

#### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Отсутствуют.

#### ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА

1. Определение содержание GSH в сыворотке крови. Осуществляют общепринятыми методами.

2. Риск развития ОПП устанавливается при снижении содержания GSH в сыворотке крови ниже показателя допустимой нормы (согласно инструкции к используемому методу определения GSH).

3. При установлении риска развития ОПП проводится профилактическое лечение, соответствующее клиническим протоколам при ОКИ у детей.

#### ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ИЛИ ОШИБОК

Нарушение правил забора крови, выполнения методики определения содержания GSH.

\_\_\_\_\_  
название  
\_\_\_\_\_  
учреждения  
\_\_\_\_\_  
здравоохранения

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Е.Н.Кроткова

\_\_\_\_\_201\_\_\_\_\_  
МП

## А К Т

учета практического использования инструкции по применению

**1. Инструкция по применению:** «Метод оценки риска развития острого повреждения почек у детей с острыми кишечными инфекциями».

**2. Утверждена Министерством здравоохранения Республики Беларусь**  
№. \_\_\_\_\_

**3. Кем предложена разработка:** сотрудниками Учреждения образования «Гродненский государственный медицинский университет»: зав. кафедрой инфекционных болезней, д.м.н. профессором Цыркуновым В. М., ассистентом кафедры инфекционных болезней Парфенчик И. В.

**4. Материалы инструкции использованы для**

\_\_\_\_\_  
**5. Где внедрено:**

\_\_\_\_\_  
подразделение и название учреждения здравоохранения

**6. Результаты применения метода за период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_**

общее кол-во наблюдений « \_\_\_\_\_ »

положительные « \_\_\_\_\_ »

отрицательные « \_\_\_\_\_ »

**7. Эффективность внедрения (восстановление трудоспособности, снижение заболеваемости, рациональное использование коечного фонда, врачебных кадров и медицинской техники)** \_\_\_\_\_

**8. Замечания, предложения:**

\_\_\_\_\_201\_\_\_\_\_  
Ответственные за внедрение

\_\_\_\_\_  
Должность

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
И.О.Фамилия

Примечание: акт о внедрении направлять по адресу:  
кафедра инфекционных болезней УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
ул. Горького, 80, 230009, г. Гродно

