**КЛИНИКО-
ГОРМОНАЛЬНАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ЖЕНЩИН В УСЛОВИЯХ
ХИРУРГИЧЕСКОЙ И
ЕСТЕСТВЕННОЙ
МЕНОПАУЗЫ**

*Милош Татьяна Сергеевна, доцент кафедры акушерства и
гинекологии, к.м.н.,
УО «ГрГМУ»*

АКТУАЛЬНОСТЬ

Согласно последним данным Американской ассоциации сердца (American Heart Association), в настоящее время инфаркт миокарда (ИМ) и другие сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) ежегодно диагностируются у 35 из 1000 женщин в возрасте от 45 до 54 лет, 60 из 1000 женщин в возрасте от 55 до 64 лет и 70 из 1000 женщин в возрасте от 65 до 74 лет. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) показала, что ведущая причина смертности у женщин старше 45 лет – ССЗ; после них следуют болезни легких, сахарный диабет и рак.

**Дубровина, А.В. Влияние менопаузальной гормональной терапии на сердечно-сосудистую систему/
Дубровина, А.В., Эбдиева З.Д., Юренева С.В., Васюк Ю.А., Шупенина Е.Ю. //Акушерство и гинекология:
новости, мнения, обучение. - №2.- 2017. -С.21-25.**

АКТУАЛЬНОСТЬ

Тотальная аднексэктомия у пациенток

Частота гистерэктомий с тотальной аднексэктомией (ТА) у пациенток в возрасте 45-54 года составляет 80%

Каждая 3я-4я молодая женщина находится в состоянии хирургической менопаузы

1. Никитина, Т. И. Хирургическая менопауза: патогенез, кардиологические риски, стандарты ведения: автореф. ... дис. д-ра мед. наук: 14.01.01 / Т. И. Никитина; Первый МГМУ им. И. М. Сеченова МЗ РФ.– М., 2015. – 48 с.
2. Юренева, С. В. Менопаузальные вазомоторные симптомы: социальные аспекты, динамика, кардиометаболические риски и возможности гормональной терапии / С. В. Юренева, Л. М. Ильина, З. Х. Эбзиева // Акушерство и гинекология : научно-практический журнал. – 2019. – N 1. – С. 26–32.
3. Walters Mark D. Hysterectomy for Benign Disease / D. Walters Mark, D. Barber Matthew // Female Pelvic Surgery Video Atlas Series.–2014. – Vol. 22. – 274 p.

Синдром постовариозэктомии

- Развивается у 80-100% женщин, перенесших оперативное вмешательство
- **60%** - тяжелое течение
- **26%** - умеренно выраженные СИМПТОМЫ
- **14 %** легкое течение
- **72-89% пациенток – проявления уже в 1-ю неделю после операции!!!**

Кобзарь, Н. Н. Течение постовариозектомического синдрома / Н. Н. Кобзарь // Репродуктивная медицина. - 2015. – № 1-2 (20). - С. 43-45.

Franco, O. H. Vasomotor Symptoms in Women and Cardiovascular Risk Markers: Systematic Review and Meta-Analysis / O.H. Franco [et al.] / Maturitas. - 2015. - Vol. 81., №3. - P. 353-361.

Maki, P. M. Summary of the National Institute on Aging-sponsored conference on depressive symptoms and cognitive complaints in the menopausal transition / P.M. Maki [et al.] // Menopause. – 2010. - №.17 - P. 815-822.

Хирургическая менопауза

Концентрация прогестерона и эстрадиола в организме женщины до и после хирургического вмешательства

Овариэктомия, овариэктомия + гистерэктомия	Дефицит прогестерона
	Дефицит эстрогенов
	Дефицит андрогенов

Сердечно-сосудистые заболевания – основная причина смерти женщин в постменопаузе

**СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ ЗАНИМАЮТ
1 МЕСТО (51%) СРЕДИ
ПРИЧИН СМЕРТНОСТИ У
ЖЕНЩИН В ЕВРОПЕ !!**

**Падение
уровня
эстрогенов
при
хирургической
менопаузе
ведет к
увеличению
числа
факторов
атерогенеза**

норма

атеросклеротическая
бляшка

стеноз
артерии

Атеросклероз

**Ишемический инсульт
(ИИ)**

АД > 140/90 мм рт.ст.

**Гипертония
↑ в 5 раз**

Основная причина смертности – сердечно-сосудистые заболевания, а не онкопатология

Результаты в зависимости от
возраста

◆ Женщины, у которых **спонтанная** или **ятрогенная** менопауза наступает в возрасте до 40-45 лет, имеют повышенный риск **сердечно-сосудистых заболеваний** и остеопороза, а также более высокий риск развития аффективных расстройств и деменции.

Parker W. H. et al Ovarian conservation at the time of hysterectomy for benign disease // Obstet. – 2005. – Vol. 106 (2). – P. 219–226.

Ишемическая болезнь сердца Hormone replacement therapy and the menopause- 4th edition June 2002, p.74

Тотальная овариэктомия (ТО)

Дефицит эстрогенов - резкое снижение
17-β эстрадиола (E2)

Низкий уровень
ГСПС- ↑свТ

↓Активности
липопротеинлипазы

↓выработки монооксида азота (NO),
нарушение целостности эндотелиальной
выстилки сосуда

↑ ЛПНП и ↓ЛПВП

↑ **высвобождения эндотелина**

Висцеральное ожирение

↓чувствительности рецепторов к
вазодилаторам,
↑содержания тромбоксана A2

**Нарушение углеводного и липидного обменов,
эндотелиальная дисфункция, потеря костной ткани и
ухудшение реологических свойств крови**

**Повышение агрегации
тромбоцитов**

**Повышение сосудистого
тонуса**

**Повышение риска сердечно-сосудистых
заболеваний**

Последствия оперативной менопаузы для сердечно-сосудистой системы (связанные со снижением эстрогенов)

1. Прямые эффекты

Активация ренин-ангиотензиновой системы, повышение уровня ангиотензина II и эндотелина-1, снижение выработки монооксида азота NO

2. Непрямые эффекты

Висцеральное ожирение, дислипидемия, увеличение уровня триацилглицеридов, инсулинорезистентность, повышение АД, хроническое воспаление

Оксидативный стресс, пролиферация васкулярных клеток, воспаление стенки сосудов, эндотелиальная дисфункция.

ЛАБОРАТОРНЫЕ КРИТЕРИИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ МЕНОПАУЗЫ

- низкий уровень АМГ (0,6 до 0,3 пг/мл и ниже)
- низкий уровень ингибина В (45 пг/мл и ниже)
- низкий уровень эстрадиола
- высокое содержание ФСГ, индекс ФСГ/ЛГ менее **единицы**
- величина соотношения E_2/E_1 составляет **менее единицы**, возможна относительная гиперандрогения
- низкий уровень ГСПС (SHBG)

Цель исследования:

- изучить особенности клинико-гормональной характеристики женщин в условиях хирургической и естественной менопаузы .**

Дизайн исследования:

- пациентки (n=127),

1-я группа (n=77)	хирургическая менопауза или двухсторонняя овариоэктомия (ДО) - 50 (48;53) лет.
2-я группа (n=32)	естественная менопауза
3-я группа (n=18)	контроль – 46 (44;50) года

Дизайн исследования:

- Критерии **включения**: 1-я группа возраст 48,0(1,4; 2,3) лет $p=0.0003^{***}$), наличие в анамнезе тотальной аднексэктомии с гистерэктомией либо изолированно, с давностью операции от 1 года до 5 лет; наличие климактерических симптомов; отсутствие в анамнезе приема препаратов менопаузальной гормональной терапии и их аналогов.
- II группа : возраст 44-57 лет, аменорея 1 год и более, наличие клинических и лабораторных (уровень фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) в крови более 30 МЕ/л) признаков эстрогенного дефицита. Средний возраст пациенток на момент обследования составил $51,0 \pm 4,3$ года лет, возраст наступления менопаузы – $49,2 \pm 3,3$ года, длительность менопаузы – от 1 года до 5 лет, наличие КС
- Критерии **исключения**: АГ 3-й степени по классификации ВОЗ/МОАГ, 1999 (уровень сАД ≥ 180 мм рт. ст. и/или дАД ≥ 110 мм рт.ст.), симптоматическая АГ, ИБС, атеросклероз сосудов головного мозга, периферических артерий, СН; БА и тяжелые заболевания легких, сопровождающиеся ДН; печеночная и почечная недостаточность; СД, заболевания ЩЖ, с нарушениями ее функции; мигрень, эпилепсия, нарушения мозгового кровообращения в анамнезе.

Методы исследований:

- Жалобы, анамнестические данные.
- Степень тяжести климактерического синдрома оценивали по модифицированному менопаузальному индексу (ММИ) Куррегманн в модификации Е. М. Вихляевой, 2008.

Показатели
тяжести КС

Методы исследования

- уровни фолликулостимулирующего гормона (ФСГ),
- лютеинизирующего гормона (ЛГ),
- эстрадиола (E2),
- прогестерона (П)
- тиреотропного гормона (ТТГ) автоматическим методом ферментсвязанного флуоресцентного анализа при 450 нм на приборах серии VIDAS, Франция.

Гормональные
параметры крови

Статистическая обработка

- После проверки данных на нормальность, рассчитывали медиану, межквартильный интервал (25-й и 75-й процентиля). Для оценки статистической значимости различий при неравномерном распределении признака использовался U-критерий Манна-Уитни. Различия считали статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты исследований

Характеристика модифицированного менопаузального индекса (ММИ) у женщин с УЯ

■ Легкая

■ Средняя

■ Тяжелая

Результаты

исследований

Таблица 1 – Характеристика модифицированного менопаузального индекса (ММИ) у женщин с хирургической менопаузой (ХМ) и естественной менопаузой (ЕМ)

Показатели ММИ (степень выраженности в баллах)	Группы женщин		
	Контроль (n=18)	ХМ (n=38)	ЕМ (n=29)
Нейровегетативные симптомы	4,5 (4,0; 7,0)	24,5 (17,0;31,0)**	20,0 (14,0;25,0) **
Метаболические симптомы	1,0 (1,0;2,0)	4,0 (3,0;6,0)*	4,0 (2,0;5,0) *
Психоэмоциональные симптомы	1,0 (1,0;3,0)	6,5 (5,0;10,0)**	7,0 (3,0;11,0) **
Менопаузальный индекс- сумма баллов	7,0 (5,0; 11,0)	37 (26,0;43,0)	28,0 (22,5;38,0)

Примечания:1 – Данные представлены в виде медианы Me (25-й; 75-й процентиля).

2 –* – $p < 0,05$, ** – $p < 0,001$ – различия статистически значимы между показателями контрольной и опытных групп.

3 – # – $p < 0,05$, ## – $p < 0,001$ – различия статистически значимы между показателями опытных групп.

Результаты исследований

Результаты исследований

Результаты исследований

Научно-практическая деятельность

Министерство здравоохранения Республики Беларусь

Учреждение образования
«Гродненский государственный медицинский университет»

МЕТОДЫ УСТАНОВЛЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ
СОСТОЯНИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ,
СВЯЗАННЫХ С ИСКУССТВЕННО ВЫЗВАННОЙ МЕНОПАУЗОЙ

Инструкция по применению

Гродно, 2017

АВТОРЫ:

к.м.н. Т.С.Милош

д.м.н., профессор Л.В.Гутикова,

к.м.н., доцент В.Л.Зверко

ВЫВОДЫ

- ◆ **Выключение функции яичников хирургическим путем вызывает развитие постовариэктомического синдрома:**
- ◆ **Снижение показателей стероидных и тенденция к снижению тиреоидного гормона,**
- ◆ **Содержание прогестерона у женщин с ХМ было ниже в 1,5 раза ($p < 0,05$) в сравнении с показателями группы контроля и на 10,4% ($p < 0,05$) ниже, в сравнении с неоперированными пациентками. Между тем, уровни ФСГ, ЛГ, эстрадиола у женщин I и II групп статистически значимо не отличались ($p > 0,05$). Показатель функции щитовидной железы - тиреотропный гормон у женщин с ЕМ и ХМ статистически значимо не отличались от показателей в группе контроля.**

ВЫВОДЫ

◆ У пациенток после удаления яичников по сравнению с женщинами с естественной менопаузой наблюдается более тяжелое течение климактерического синдрома и более выраженные нейровегетативные нарушения, отмечается дефицит стероидных половых гормонов, проявляющийся повышением уровней ФСГ и ЛГ при одновременном снижении уровней эстрадиола, прогестерона, более выраженный у женщин после хирургического выключения функции яичников, что свидетельствует о более тяжелом периоде постменопаузальной адаптации и требует своевременной коррекции.

Спасибо за внимание!