

Экзаменационные рецепты по дерматовенерологии для студентов педиатрического факультета

1. Антигистаминные препараты

блокаторы H1-гистаминовых рецепторов:

Chloropyramine (Suprastin) 25 мг х 3-4 раза в сутки

Mebhydrolin (Diazolinum) 0,1 по 1 таб.х 1-2 раза в день.

Clemastine (Tavegyl) 0,001x 2 раза в день.

Loratadine (Klaritin) 0,01 x 1 раз в день.

Хифенадин (Phencarolum) 0,025 по 1 таб. 3 раза в день.

Cetirizine (Parlazin) 0,01 x 1 раз в день.

стабилизаторы мембран тучных клеток

Ketotifen 0,001 по 1 x 2 раза в день во время еды

2. Гипосенсибилизирующие препараты

Calcii gluconas в/в, в/м, внутрь (0,5)

Natrii thiosulfas 30% - 10ml (5ml) в/в

3. Иммунокорректоры и иммуномодуляторы

Plasmolum 1,0 п/к ежедневно или через день №10

Tactivinum 0,01%-1,0 п/к ежедневно 5-10 дней

Methyluracilum 0,5 мг х 4 раза в день во время еды 3-4 недели.

4. Препараты для специфической иммунотерапии при стафилодермии

Анатоксин стафилококковый вводится подкожно с 0,1 мл, каждый раз дозу увеличивая на 0,1 мл довести до 0,3 мл 3 раза в неделю

Антистафилококковый иммуноглобулин 5 мл 1 раз в неделю №5.

5. Иммуносупрессивные препараты (цитостатики)

Methotrexatum 0,0025-0,005 внутрь 2,5 мг х 2 р. в день 5 дн, 3 дня перерыв.

Cyclophosphanum 0,05; в амп по 0,2-ежедневно в/м. Курсовая доза 8-14 г.

6. Биогенные стимуляторы

Extractum Aloes fluidum 1,0 п/к ежедневно №10

Plasmolum 1,0 п/к ежедневно или через день №10.

7. Гормональные препараты

Prednisolone 0,005

Dexamethasone 0,0005

Diprospan 1,0 мл в/м 1 раз в 2 недели (пролонгированный)

Adrenalinum 0,1%-1,0 п/к

Retabolil 5%-1,0 1 раз в 3 недели.

8. Противовирусные препараты

Aciclovir 200-400 мг х 5 раз в день 5-10 дней

Valaciclovir (Valtrex) 0,5 х 2 раза в день 5-10 дней

9. Противотуберкулезные препараты **Rifampicinum 0,3 х 2 раза в день.**

10. Противолепрозные препараты группы сульфонов

Dapsone циклами по 4-5 недель

11. Антибиотики и сульфаниламиды

Синтетические аналоги пенициллина: **Ampicillin** 0,5 х 4 раза в день

Макролиды:

Erythromycin 0,5 х 4 раза в день

Azythromycin (Sumamed) 250; 500мг капсулы

Аминогликозиды: **Gentamicin 2%-2,0 ампулы**

Цефалоспорины:

Cefalexin 0,25, по 2 капсулы х 4 раза в день-2 дня, затем 0,25 х 4 раза в день

Ceftriaxon в/м 1,0 г через 12 часов 2 раза в день

Тетрациклины:

Tetracycline 0,5 х 4 раза в день

Doxycyclinum hydrochloridum 0,1 х 2 раза в день

Производные фторхинолона:

Ofloxacin 200; 400 мг таблетки, по 200 мг 2 раза в день

Ciprofloxacinum 250; 500 мг таблетки, по 500 мг каждые 12 часов

Антибактериальные сульфаниламидные препараты:

Sulfadimethoxinum 1,5 г х 3 раза в сутки

Biseptol 960, 480, 120

12. Антимикотические препараты

Производные имидазола:

Ketoconazole (Nizoral) 0,2 г х 1-2 раза в день.

Itraconazole (Orungal) 100мг капсулы, по 100-200 мг х 1-2 раза в день

Fluconazole (Diflucan) 150 мг (капс) однократно, или 50мг х 1 р. в день.

Аллиламины: **Terbinafine (Lamisil) 125; 250 мг**

Полиеновые антибиотики: **Nystatinum 500000 ЕД х 3-4 раза в день**

Антимикотик для лечения дерматофитий:

Griseofulvin 125 мг таблетки, по 10-22 мг/кг в сутки.

13. Препараты хинолинового ряда (терапия хронической красной волчанки) Plaquenil (гидроксихлорохин) 0,2 x 2 раза в день.

14. Витамины и их аналоги

Retinol (A) 33000 МЕ x 3 раза в день

Thiaminum chloridum (B1) 2,5%-1,0 в/м 1 раз в день

Pyridoxinum (B6) 1%-1,0 №10 по 1,0 в/м 1-2 раза в день

Acidum folicum 0,001 x 2-3 раза в день

Cyanocobalaminum (B12) 0,01%-1,0 в/м 1 раз в день

Acidum ascorbicum (C) 0,05 по 1-2 таблетки x 3 раза в день, 5%-1,0 в/м 1 раз в день.

15. Ферментные препараты

Lydase 64 ED (в ампуле) растворить в 1 мл 0,5% раствора новокаина, п/к

16. Нестероидные противовоспалительные средства

Indomethacin (Metindol) 0,025 x 2-3 раза в день

Diclofenac 0,025-0,05 x 2-3 раза в день

Ibuprofen 0,2 x 3-4 раза в день.

17. Препараты, улучшающие микроциркуляцию

Xantinoli nicotinas 0,15 по 1 x 3 раза в день

Trental (Pentoxifylline) 0,1 по 2 драже x 3 раза в день

18. Препараты, используемые в терапии сифилиса

Bicillin-1 2,4 млн.ЕД в/м 1 раз в 5 дней №3

Penicillini (Новокаиновая соль пенициллина) в/м 600000 ЕД 2 раза в д.

Benzylpenicillini (Бензилпенициллина натриевая соль) 1 млн. ЕД в/м

19. Препараты, используемые в терапии гонореи

Ceftriaxon в/м 1,0 г через 12 часов 2 раза в день

Ofloxacin - первый прием 400 мг, затем каждые 12 часов по 200 мг 2 р. в день

20. Ингибиторы кальциневрина

Pimecrolimus (Elidel) 1% крем 2 р. в день (с 3-х мес при атопич. дерматите)

21. Противомикробные наружные средства

Аминогликозиды: Ung. Gentamicini

Макролиды: Ung. Erythromycini

Антибиотик комбинированный Zineryt (наружное лечение акне)

22. Антимикотические препараты для наружной терапии

Производные имидазола: Clotrimazole, Ketoconazole (Nisoral)

Производное имидазола и бензотиофена: Sertaconazole (Zalain)

Аллиламины: Terbinafine (Lamisil)

23. Противовирусные препараты для наружной терапии:

Aciclovir, Herpevir, Zovirax.

24. Противопаразитарные препараты для наружной терапии

Benzylbenzoate мазь или эмульсия 20%, детям 10% при чесотке.

Permethylrin аэрозоль, крем 1%, шампунь 0,3%, эмульсия 0,3% при педикулезе и чесотке

Aerosolum «Spregal» аэрозоль при чесотке

Nittifor (Permethylrin) раствор при педикулёзе.

25. Основные топические глюкокортикоидные препараты

I группа (слабые):

Ung. hydrocortisoni 0,5%-1% - 10,0

Ung. prednisoloni 0,5% - 10,0

II группа(средние):0

Ftorocort

Flucinar мазь, гель 0,025% - 15,0 1-2 р/сут

III группа (сильные):

Advantan мазь, крем, эмульсия 0,1% - 15,0-20,0

Locoid

Elocom

Celestoderm

IV группа (очень сильные): Dermovate

1. Мази, содержащие только кортикоиды: Unguentum

Hydrocortisone (гидрокортизоновая), **Unguentum Prednisolone** (преднизолоновая), **Ftorocort** (фторокорт).

2. Кортикоидные лекарственные формы с антибиотиками:

Celestoderm-V with garamycin (целестодерм-В с гарамицином), **Unguentum Hioxysonium** (гиоксизон), **Oxycort** (оксикорт) – мазь, аэрозоль.

3. Кортикоидные мази с кератопластическими средствами в составе: Lorinden A (лоринден А) – мазь 15г, **Betasalic** (бетасалик), **Diprosalic** (дипросалик).

4. Трехкомпонентные кортикоидные мази с антибиотиками и антимикотиками: Triderm (содержит противогрибковый,

антибактериальный, гормональный компоненты).