УО «ГрГМУ»
Кафедра пропедевтики внутренних болезней
Анализ мочи по Зимницкому №1

Ф.И.О._____*Родина В.И.*_____

№ порции	Часы	Удельный вес	Количество, мл
1	9:00	1008	280
2	12:00	1006	290
3	15:00	1009	250
4	18:00	1009	220
5	21:00	1008	300
6	00:00	1005	250
7	3:00	1007	230
8	6:00	1005	300

Дневной диурез _____1040_____мл
Ночной диурез _____1080_____мл
Общий диурез _____2120_____мл

Изменения: гипоизостенурия, полиурия, никтурия, изурия – характерны для хронической почечной недостаточности.

УО «ГрГМУ»
Кафедра пропедевтики внутренних болезней
Анализ мочи по Зимницкому №2

Ф.И.О._____*Марков А.С.* _____

№ порции	Часы	Удельный вес	Количество, мл
1	9:00	1030	300
2	12:00	1032	320
3	15:00	1030	280
4	18:00	1036	300
5	21:00	1034	350
6	00:00	1030	360
7	3:00	1032	350
8	6:00	1034	300

Дневной диурез _____1200_____мл
Ночной диурез _____1360_____мл
Общий диурез _____2560_____мл

Изменения: гиперстенурия, полиурия – характерны для сахарного диабета.

УО «ГрГМУ»
Кафедра пропедевтики внутренних болезней
Анализ мочи по Зимницкому №3

Ф.И.О._____*Петрович И.С.*____

№ порции	Часы	Удельный вес	Количество, мл
1	9:00	1028	60
2	12:00	1026	80
3	15:00	1028	60
4	18:00	1030	50
5	21:00	1032	50
6	00:00	1028	60
7	3:00	1030	40
8	6:00	1032	40

Дневной диурез _____250_____мл
Ночной диурез _____190_____мл
Общий диурез _____440_____мл

Изменения: олигоурия, гиперстенурия – характерны для острого нефрита, острой почечной недостаточности.

УО «ГрГМУ»
Кафедра пропедевтики внутренних болезней
Анализ мочи по Зимницкому №4

Ф.И.О._____*Заметин В.И.*_____

№ порции	Часы	Удельный вес	Количество, мл
1	9:00	1011	220
2	12:00	1012	190
3	15:00	1009	150
4	18:00	1010	160
5	21:00	1010	210
6	00:00	1012	150
7	3:00	1013	160
8	6:00	1011	230

Дневной диурез _____720_____мл
Ночной диурез _____750_____мл
Общий диурез _____1470_____мл

Изенения: изостенурия, никтурия, изурия – характерны для хронической почечной недостаточности.

УО «ГрГМУ»
Кафедра пропедевтики внутренних болезней
Анализ мочи по Зимницкому №5

Ф.И.О._____*Жариков И.П.*_____

№ порции	Часы	Удельный вес	Количество, мл
1	9:00	1014	260
2	12:00	1018	240
3	15:00	1020	290
4	18:00	1019	220
5	21:00	1024	160
6	00:00	1026	100
7	3:00	1025	110
8	6:00	1022	130

Дневной диурез _____1010_____мл
Ночной диурез_____500_____мл
Общий диурез _____1510_____мл

В данном анализе разница между минимальным и максильным значением удельного веса больше 10, разница между минимальным и максимальным количеством мочи в порциях больше 100, дневной диурез преобладает над ночным. Это пример нормы.

УО «ГрГМУ»
Кафедра пропедевтики внутренних болезней
Анализ мочи по Зимницкому №6

Ф.И.О._____*Коронок Е.А.*_____

№ порции	Часы	Удельный вес	Количество, мл
1	9:00	1004	80
2	12:00	1003	60
3	15:00	1005	50
4	18:00	1006	50
5	21:00	1004	55
6	00:00	1005	50
7	3:00	1006	30
8	6:00	1005	40

Дневной диурез _____240_____мл
Ночной диурез_____175_____мл
Общий диурез_____415_____мл

Изменения: олигурия, гипоизостенурия, никтурия, изурия – данные изменения характерны для хронической почечной недостаточности

УО «ГрГМУ»
Кафедра пропедевтики внутренних болезней

Анализ мочи по Зимницкому №7

Ф.И.О._____*Иванов ИИ..*_____

№ порции	Часы	Удельный вес	Количество, мл
1	9:00	-	-
2	12:00	-	-
3	15:00	-	-
4	18:00	-	-
5	21:00	-	-
6	00:00	-	-
7	3:00	-	-
8	6:00	-	-

Дневной диурез _____-_____мл
Ночной диурез _____-_____мл
Общий диурез _____-_____мл

Анурия – острая почечная недостаточность, шоковая почка