СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ГЛПС: ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Н.С.Чешейко[1],Т.Е.Дороженкова[2]

1 – старший преподаватель кафедры эпидемиологии, УО «БГМУ»;

2-доцент кафедры эпидемиологии, УО «БГМУ»

Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь

Актуальность

Изучение геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) в Республике Беларусь обусловлено сложившимся характером ее как серьезного природно-очагового заболевания, ежегодным выявлением новых случаев заболеваний и высокими рисками развития тяжелых осложнений у трудоспособного населения. Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация в стране оценивается как контролируемая, ГЛПС требует постоянного мониторинга со стороны санитарных служб из-за отсутствия вакцин и специфического лечения.



Цель исследования:


- оценить проявления эпидемического процесса ГЛПС в Беларуси за период с 2015 по 2025 годы.



Материал и методы:


- проведено ретроспективное исследование на основании данных официальной статистической отчетности за период с 2015 по 2025 годы.

Результаты




В многолетней динамике заболеваемости ГЛПС населения Беларуси отмечалось неравномерное распределение случаев по годам. Показатели заболеваемости варьировались в пределах от 0,41 до 1,60 %оооо в год. Максимальный и минимальный показатели различались более, чем в 2,4 раза. Среднемноголетний показатель заболеваемости ГЛПС составил 0,73 %оооо. Анализируемый отрезок времени описывается уравнением y=0,0115x+0,6595, с величиной достоверности аппроксимации многолетней эпидемической тенденции R^2 = 0,0136.

Результаты



Показатель заболеваемости ГЛПС в разрезе административных территорий г.Минска за 2024-2025 гг.



Удельный вес заболевших ГЛПС за 2024-2025 гг.

Отмечена территориальная неравномерность распределения зарегистрированных случаев ГЛПС. За последние годы (2024-2025гг.) абсолютное большинство случаев отмечено на территории Гомельской и Могилевской областей, что составило соответственно 51,2±3,86% и 19,6±3,07% (при p≤ 0,05) или 86 и 33 случая.

Выводы

- Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом регистрируется в Беларуси ежегодно.
- Заболеваемость ГЛПС в республике имеет тенденцию к росту (Тпр.= +1,56%).
- К зоне риска относится территория Гомельской области.

